

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (1)

اختبار شهر اكتوبر



ملخص عام على الوحدات

الأعداد والعمليات عليها

الوحدة الأولى

الأعداد الحقيقية (Real Numbers)

الأعداد غير النسبية

العدد غير النسبي هو العدد الذي لا يمكن كتابته على الصورة $\frac{a}{b}$ حيث a, b عددان صحيحان ، $b \neq 0$ ويرمز لمجموعة الأعداد غير النسبية بالرمز $\mathbb{Q}^c$

أمثلة للأعداد غير النسبية:


- 1 الجذور التربيعية للأعداد التي ليست مربعات كاملة مثل: $\sqrt{3}$
- 2 الجذور التكعيبية للأعداد التي ليست مكعبات كاملة مثل: $\sqrt[3]{-16}$
- 3 النسبة التقريبية π وهي النسبة بين محيط الدائرة وطول قطرها.
- 4 النسبة الذهبية ϕ

الأعداد الحقيقية

مجموعة الأعداد الحقيقية هي المجموعة التي تتكون من اتحاد مجموعة الأعداد النسبية $\mathbb{Q}$

ومجموعة الأعداد غير النسبية $\mathbb{Q}^c$ ويرمز لها بالرمز $\mathbb{R}$

مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$



$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}^c \text{ حيث } \mathbb{Q} \cap \mathbb{Q}^c = \emptyset$$

شكل فن المقابل يوضح العلاقة بين مجموعات

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

الأعداد حيث:

$$\mathbb{Q}^c \subset \mathbb{R}$$

الفترات والعمليات عليها (Intervals and Their Operations)

الفتره هي مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الحقيقية وأى عددين حقيقيين ينحصر بينهما عدد لا نهائى من الأعداد الحقيقية، وعند كتابة الفتره نبدأ بالعدد الأصغر (a) وننتهى بالعدد الأكبر (b).

وتنقسم الفترات إلى: فترات محدودة وفترات غير محدودة.

إذا كان a و b عددين حقيقيين ، $a < b$ فإن:

أولاً الفترات المحدودة:

الفترة	التعبير الرياضى	التعبير بالصفة المميزة	التمثيل على خط الأعداد
الفترة المغلقة: $[a, b]$	$[a, b]$	$\{x : x \in \mathbb{R}, a \leq x \leq b\}$	
الفترة المفتوحة: $]a, b[$	$]a, b[$	$\{x : x \in \mathbb{R}, a < x < b\}$	
الفترة نصف مفتوحة أو الفترة نصف مغلقة: $[a, b[$	$[a, b[$	$\{x : x \in \mathbb{R}, a \leq x < b\}$	
الفترة نصف مفتوحة أو الفترة نصف مغلقة: $]a, b]$	$]a, b]$	$\{x : x \in \mathbb{R}, a < x \leq b\}$	

ثانياً الفترات غير المحدودة:


- تمتد مجموعة الأعداد الحقيقية على خط الأعداد في الاتجاه **الموجب** إلى ما لا نهاية (∞) وتمتد في الاتجاه **السالب** إلى ما لا نهاية ($-\infty$)
- يستخدم الرمز ∞ و $-\infty$ في التعبير عن المجموعات غير المحدودة وهما رمزان يعبران عن عدم معرفتنا بأكبر، وأصغر عدد.

إذا كان $a \in \mathbb{R}$ فإن:

الفترة	التعبير بالصفة المميزة	التمثيل على خط الأعداد
$[a, \infty[$	$\{x : x \in \mathbb{R}, x \geq a\}$	
$] -\infty, a]$	$\{x : x \in \mathbb{R}, x \leq a\}$	
$] a, \infty[$	$\{x : x \in \mathbb{R}, x > a\}$	
$] -\infty, a[$	$\{x : x \in \mathbb{R}, x < a\}$	

نقاط هامة

- الفترة $] -\infty, \infty[$ تعبر عن مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ حيث $\infty \notin \mathbb{R}$ ، $-\infty \notin \mathbb{R}$
- $\mathbb{R} = \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \cup \mathbb{R}^-$



حيث: $\mathbb{R}^+$ مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة $] 0, \infty[$
 $\mathbb{R}^-$ مجموعة الأعداد الحقيقية السالبة $] -\infty, 0[$

$$\mathbb{R}^+ \cup \mathbb{R}^- = \mathbb{R} - \{0\}$$

- مجموعة الأعداد الحقيقية غير السالبة $] 0, \infty[= \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$
- مجموعة الأعداد الحقيقية غير الموجبة $] -\infty, 0[= \mathbb{R}^- \cup \{0\}$


العمليات على الفترات:

تذكر أن المجموعات والعمليات عليها .

بفرض أن: $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ، $Y = \{1, 2, 3\}$ ، $X = \{2, 3, 4, 5\}$

2 التقاطع $(X \cap Y)$:


هو مجموعة العناصر التي تنتمي إلى X و Y



$$\therefore X \cap Y = \{2, 3\}$$

1 الاتحاد $(X \cup Y)$:


هو مجموعة العناصر التي تنتمي إلى X أو Y



$$\therefore X \cup Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

4 المكمل X^c :


هي مجموعة العناصر التي تنتمي إلى U ولا تنتمي إلى X



$$\therefore X^c = U - X = \{1, 6\}$$


3 الفرق $(X - Y)$:

هو مجموعة العناصر التي تنتمي إلى X ولا تنتمي إلى Y



$$\therefore X - Y = \{4, 5\}$$

إذا كانت: $A = [-4, 3]$ ، $B = [0, 8]$ فأوجد مستعينًا بخط الأعداد:



$$B^c \quad 6$$

$$B - A \quad 5$$

$$A^c \quad 4$$

$$A - B \quad 3$$

$$A \cup B \quad 2$$

$$A \cap B \quad 1$$

$$A \cap B = [0, 3] \quad 1$$

$$A \cup B = [-4, 8] \quad 2$$

$$A - B = [-4, 0] \quad 3$$

$$A^c = \mathbb{R} - [-4, 3] \quad \text{أو} \quad A^c =]-\infty, -4[\cup]3, \infty[\quad 4$$

$$B - A =]3, 8[\quad 5$$

$$B^c = \mathbb{R} - [0, 8] \quad \text{أو} \quad B^c =]-\infty, 0[\cup]8, \infty[\quad 6$$

العمليات على الأعداد الحقيقية (Operations on Real Numbers)

خواص العمليات (+, ×) على الأعداد الحقيقية:

إذا كانت a, b, c ثلاثة أعداد حقيقية فإن:

الخاصية	في عملية الجمع	في عملية الضرب
الانغلاق	$a + b \in \mathbb{R}$	$a \times b \in \mathbb{R}$
الإبدال	$a + b = b + a$	$a \times b = b \times a$
الدمج (التجميع)	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
توزيع الضرب على الجمع		$a(b + c) = ab + ac$ ، $(b + c)a = ba + ca$
المحايد	المحايد الجمعي هو 0 $a + 0 = 0 + a = a$	المحايد الضربي هو 1 $a \times 1 = 1 \times a = a$
المعكوس	المعكوس الجمعي للعدد a هو $(-a)$ حيث: $a + (-a) = 0$	المعكوس الضربي للعدد a هو: $\frac{1}{a}$ (حيث $a \neq 0$) حيث: $a \times \frac{1}{a} = 1$

قوانين الجذور التربيعية والتكعيبية (Laws of Square and Cube Roots)

ضرب وقسمة الجذور التربيعية:

إذا كان a, b عددين حقيقيين غير سالبين، فإن:

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b} \quad 1$$

ضرب وقسمة الجذور التكعيبية:

إذا كان a, b عددين حقيقيين، فإن:

$$\sqrt[3]{a} \times \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{a \times b} \quad 1$$

$$\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}} = \sqrt[3]{\frac{a}{b}} \quad , \quad b \neq 0 \quad 2$$

قوانين الأسس في الأعداد الحقيقية (Laws of Exponents in Real Numbers)

قوانين الضرب:

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \quad 1$$

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n \quad 2$$

الأسس الصفرى والأس السالب:

$$a^0 = 1 \quad 1$$

قوانين القسمة:

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad 1$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad 2$$

$$a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n \quad 2$$

التحليل بإخراج العامل المشترك الأكبر (Factorizing by Taking Out Greatest Common Factor GCF)

تحليل كثيرة الحدود بإخراج العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ)

كثيرة الحدود هي تعبير رياضي فيه جميع أسس متغيراته (إن وجدت) تكون أعدادًا صحيحة موجبة.


أمثلة لكثيرات الحدود:

• كثيرة حدود (وحيدة الحد): $-x$, $2ab$, y^2 , $\frac{1}{2}xy$ • كثيرة حدود (ثنائية حدود): $x^2 + 2xy$, $2a^2b + 3ba$, $x - y$

• كثيرة حدود (ثلاثية حدود): $x^3 + x^2 - 3y$, $2a^2 + 3b + 8$





تحليل كثيرة الحدود: هو تحويل كثيرة الحدود إلى حاصل ضرب عاملين (أو أكثر):

عند تحليل كثيرة الحدود $(9a^2 - 12a)$ نتبع الخطوات الآتية:



كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين

مثلا ازاي نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9



حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (2)

اختبار شهر اكتوبر



المجموعة الأولى : اختر الإجابة الصحيحة:

1 ما ناتج $(\sqrt{3})^3 \times (\sqrt{3})^{-4}$ ؟

(أ) $\sqrt{3}$ (ب) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

(ج) 3 (د) $\frac{1}{3}$

2 إذا كان $x+1 < \sqrt{5} < x$ ، $x \in \mathbb{Z}$ فإن قيمة $2x$ تساوى

(أ) 6 (ب) 7

(ج) 8 (د) 4

المجموعة الثانية: أجب عما يلي:

1 إذا كانت: $X = [2, 6]$ ، $Y =]1, 3]$ فأوجد: مستعيناً بخط الأعداد: $X \cup Y$ ، $X \cap Y$ ، $X - Y$

2 اختصر لأبسط صورة: $5\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{81} + \sqrt[3]{24}$

3 حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى لكل مما يأتي:

(أ) $5x^2 - 10x^3 + 15x^4$

(ب) $x(x+1) + 7(x+1)$

4 إذا كان: $a = \sqrt{7} - \sqrt{5}$ ، $b = \frac{2}{a}$ فأوجد في أبسط صورة:

(أ) ab

(ب) $a - b$

المجموعة الأولى : اختر الإجابة الصحيحة:

1 أي من الأعداد التالية عدد غير نسبي؟

- (أ) 2.5 (ب) $2\frac{1}{3}$
(ج) $\sqrt[3]{9}$ (د) $\sqrt{6.25}$

2 إذا كانت $a \in]2,5[$ فإن a يمكن أن تساوى أيًا مما يلي:

- (أ) 1 (ب) 2
(ج) 4 (د) 5

المجموعة الثانية: أجب عما يلي:

1 أوجد ناتج كل مما يأتي في أبسط صورة:

- (أ) $2\sqrt{3}(3\sqrt{3}-5)$ (ب) $(3\sqrt{5}-2)^2$

2 إذا كان محيط مستطيل $\sqrt{300}$ متر و طول له $\sqrt{27}$ متر أوجد عرضه.

3 إذا كانت $x = 2\sqrt{5}$ ، $y = 5\sqrt{2}$ فأوجد القيمة العددية للمقدار: $(x^2 - y^2)^{-1}$

4 إذا كان: $x + y = 10$ ، $a - b = 7$ فأوجد القيمة العددية للمقدار: $x(a - b) + y(a - b)$

المجموعة الأولى : اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 إذا كانت : $X = [-5, 7[$ فأى مما يلي صحيح ؟
- (أ) $7 \in X$ (ب) $-5 \notin X$
- (ج) $0 \notin X$ (د) $-2 \in X$
- 2 $6x^2 + 18xy = 6x(..... +)$
- (أ) $x+y$ (ب) $3x-y$
- (ج) $x+3y$ (د) $20x^3y$

المجموعة الثانية: أجب عما يلي:

- 1 أوجد Q مجموعة حل المعادلة الآتية: $2x^3 - 7 = 9$
- 2 اجعل المقام فى كل مما يأتى عدداً صحيحاً، واكتب العدد فى أبسط صورة:
- (أ) $\frac{3}{\sqrt{6}}$ (ب) $\frac{8}{1-\sqrt{3}}$
- 3 اختصر لأبسط صورة: $\sqrt{108} - \sqrt{48} + 2\sqrt{27} + \sqrt{75}$
- 4 أوجد فى أبسط صورة: $\frac{(8)^x \times (9)^x}{(18)^x}$ ثم أوجد القيمة العددية للنتاج عندما $x = 2$

المجموعة الأولى : اختر الإجابة الصحيحة:

1 العددان الصحيحان المتتاليان اللذان ينحصر بينهما العدد $\sqrt{21}$ هما ،

(أ) 22 ، 20 (ب) 7 ، 6

(ج) 6 ، 5 (د) 5 ، 4

2 أى مما يلي يكافئ $\frac{3\sqrt{2}}{2\sqrt{18}}$ ؟

(أ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (ب) $\frac{1}{2}$

(ج) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ (د) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

المجموعة الثانية: أجب عما يلي:

1 إذا كانت: $X =] - \infty , 3]$ ، $Y =] - 2 , 5 [$

فأوجد مستعيناً بخط الأعداد:

$$X^c , X - Y , X \cap Y , X \cup Y$$

2 أوجد ناتج ما يأتى فى أبسط صورة:

$$(\sqrt{5} - 1)^2 + (\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2)$$

3 اختصر لأبسط صورة: $\frac{(\sqrt{3})^{-9} \times (\sqrt{3})^5}{(\sqrt{3})^4 \times (\sqrt{3})^{-5}}$

4 باستخدام التحليل بإخراج العامل المشترك الأعلى أوجد القيمة العددية للمقدار: $6 \times \frac{5}{7} + 2 \times \frac{5}{7} - \frac{5}{7}$

المجموعة الأولى : اختر الإجابة الصحيحة:

1 ما تقدير العدد $\sqrt{72}$ لأقرب عدد صحيح؟

- (أ) 7 (ب) 6
(ج) 8 (د) 9

2 مجموع جميع الأعداد الحقيقية التي تنتمي للفترة $[-13, 13]$

- (أ) -13 (ب) 13
(ج) 26 (د) 0

المجموعة الثانية: أجب عما يلي:

1 أوجد ناتج ما يأتي في أبسط صورة:

$$(\sqrt{7} - 2)^2 + (\sqrt{7} + 3)(\sqrt{7} - 1)$$

2 اختصر لأبسط صورة: $\frac{3}{2} \sqrt[3]{256} + \frac{12}{\sqrt[3]{16}} + \sqrt[3]{32}$

3 إذا كانت $3^x = 5$ فأوجد القيمة العددية لكل من:

- (أ) 3^{x+1} (ب) 3^{x-1} (ج) $3^{x+2} + 3^{x+3}$

4 حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى لكل مما يأتي:

$$12x^3 + 6x^2 - 24x^4 \quad (أ)$$


$$x(x-1) + 5(1-x) \quad (ب)$$

المجموعة الأولى: اختر الإجابة الصحيحة:

$$\frac{\sqrt{3}}{3} \quad 1$$

4 2

المجموعة الثانية: أجب عما يلي:



1

$$X \cup Y =]1, 6]$$

$$X \cap Y = [2, 3]$$

$$X - Y =]3, 6]$$

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \sqrt[3]{24} + \sqrt[3]{81} - 5\sqrt[3]{3} &= \sqrt[3]{3 \times 8} + \sqrt[3]{27 \times 3} - 5\sqrt[3]{3} \\ &= 2\sqrt[3]{3} + 3\sqrt[3]{3} - 5\sqrt[3]{3} \\ &= 5\sqrt[3]{3} - 5\sqrt[3]{3} = 0 \end{aligned}$$

2

$$\blacktriangleright 5x^2 - 10x^3 + 15x^4 = 5x^2(1 - 2x + 3x^2)$$

(أ) 3

$$\blacktriangleright x(x+1) + 7(x+1) = (x+1)(x+7)$$

(ب)

(أ) 4

$$\blacktriangleright b = \frac{2}{a} = \frac{2}{(\sqrt{7} - \sqrt{5})} \times \frac{(\sqrt{7} + \sqrt{5})}{(\sqrt{7} + \sqrt{5})} = \frac{2(\sqrt{7} + \sqrt{5})}{7 - 5} = \sqrt{7} + \sqrt{5}$$

$$b = \sqrt{7} + \sqrt{5}$$

$$\blacktriangleright ab = 2$$

$$a - b = \sqrt{7} - \sqrt{5} - (\sqrt{7} + \sqrt{5})$$

(ب)

$$= \sqrt{7} - \sqrt{5} - \sqrt{7} - \sqrt{5} = -2\sqrt{5}$$

المجموعة الأولى : اختر الإجابة الصحيحة:

1 $\sqrt[3]{9}$

2 4

المجموعة الثانية: أجب عما يلي:

1 (أ) $2\sqrt{3}(3\sqrt{3}-5) = (2 \times 3)(\sqrt{3} \times \sqrt{3}) - (2 \times 5)\sqrt{3}$

$$= 6 \times 3 - 10\sqrt{3}$$

$$= 18 - 10\sqrt{3}$$

2 (ب) $(3\sqrt{5}-2)^2 = (3\sqrt{5})^2 - 2 \times 3\sqrt{5} \times 2 + (-2)^2$

$$= 45 - 12\sqrt{5} + 4$$

$$= 49 - 12\sqrt{5}$$

2 $\therefore \text{محيط المستطيل} = (\text{الطول} + \text{العرض}) \times 2$

$$\sqrt{300} = (\sqrt{27} + \text{العرض}) \times 2$$

$$10\sqrt{3} = (3\sqrt{3} + \text{العرض}) \times 2$$

$$5\sqrt{3} = 3\sqrt{3} + \text{العرض}$$

$$\therefore \text{العرض} = 2\sqrt{3} \text{ سم}$$

3 $(x^2 - y^2)^{-1} = ((2\sqrt{5})^2 - (5\sqrt{2})^2)^{-1}$

$$= (20 - 50)^{-1}$$

$$= (-30)^{-1}$$

$$= -\frac{1}{30}$$

4 $x(a-b) + y(a-b) = (a-b)(x+y)$

$$= 7 \times 10$$

$$= 70$$

المجموعة الأولى : اختر الإجابة الصحيحة:

$$x + 3y \quad \textcircled{2}$$

$$-2 \in x \quad \textcircled{1}$$

المجموعة الثانية: أجب عما يلي:

$$\triangleright \because 2x^3 - 7 = 9 \quad \textcircled{1}$$

$$\therefore 2x^3 = 9 + 7$$

$$\therefore 2x^3 = 16 \quad (\div 2)$$

$$\therefore x^3 = 8$$

$$\therefore x = \sqrt[3]{8}$$

$$\therefore x = 2 \notin \mathbb{Q}$$

$\therefore$ مجموعة الحل في $\mathbb{Q} = \emptyset$

$$\triangleright \frac{3}{\sqrt{6}} = \frac{3 \times \sqrt{6}}{\sqrt{6} \times \sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{2} \quad \textcircled{2} \quad (أ)$$

$$\begin{aligned} \triangleright \frac{8}{1-\sqrt{3}} &= \frac{8 \times (1+\sqrt{3})}{(1-\sqrt{3}) \times (1+\sqrt{3})} = \frac{8(1+\sqrt{3})}{1-3} \\ &= \frac{8(1+\sqrt{3})}{-2} = -4(1+\sqrt{3}) \quad (ب) \end{aligned}$$

$$\triangleright \sqrt{108} - \sqrt{48} + 2\sqrt{27} + \sqrt{75} \quad \textcircled{3}$$

$$= \sqrt{36 \times 3} - \sqrt{16 \times 3} + 2\sqrt{9 \times 3} + \sqrt{25 \times 3}$$

$$= 6\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + 2 \times 3\sqrt{3} + 5\sqrt{3}$$

$$= 6\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + 6\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 13\sqrt{3}$$

$$\triangleright \frac{(8)^x \times (9)^x}{(18)^x} = \frac{(2^3)^x \times (3^2)^x}{(2 \times 3^2)^x} = \frac{2^{3x} \times 3^{2x}}{2^x \times 3^{2x}} = 2^{3x-x} = 2^{2x} \quad \textcircled{4}$$

عندما $x = 2$


$$2^{2x} = 2^{2(2)} = 2^4 = 16$$

المجموعة الأولى: اختر الإجابة الصحيحة:

1 4 ، 5

2 $\frac{1}{2}$

المجموعة الثانية: أجب عما يلي:



1

► $X \cup Y =] - \infty , 5[$

$X \cap Y =] - 2 , 3]$

$X - Y =] - \infty , - 2]$

$X^c =] 3 , \infty [$

► $(\sqrt{5} - 1)^2 + (\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2)$

2

$$= (\sqrt{5})^2 - 2 \times \sqrt{5} \times 1 + (-1)^2 + (\sqrt{5})^2 - (2)^2$$

$$= 5 - 2\sqrt{5} + 1 + 5 - 4$$

$$= 7 - 2\sqrt{5}$$

► $\frac{(\sqrt{3})^{-9} \times (\sqrt{3})^5}{(\sqrt{3})^4 \times (\sqrt{3})^{-5}} = (\sqrt{3})^{-9+5-4+5} = (\sqrt{3})^{-3}$

3

$$= \frac{1}{(\sqrt{3})^3} = \frac{1}{3\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{9}\sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{9}$$

► $6 \times \frac{5}{7} + 2 \times \frac{5}{7} - \frac{5}{7} = (6 + 2 - 1) \times \frac{5}{7} = 7 \times \frac{5}{7} = 5$

4

المجموعة الأولى : اختر الإجابة الصحيحة:

13 2

8 1

المجموعة الثانية: أجب عما يلي:

▶ $(\sqrt{7} - 2)^2 + (\sqrt{7} + 3)(\sqrt{7} - 1)$

1

$$= (\sqrt{7})^2 - 2 \times \sqrt{7} \times 2 + (-2)^2 + 7 - \sqrt{7} + 3\sqrt{7} - 3$$

$$= 7 - 4\sqrt{7} + 4 + 4 + 2\sqrt{7}$$

$$= 15 - 2\sqrt{7}$$

▶ $\frac{3}{2} \sqrt[3]{256} + \frac{12}{\sqrt[3]{16}} + \sqrt[3]{32} = \frac{3}{2} \sqrt[3]{64 \times 4} + \frac{12}{\sqrt[3]{8 \times 2}} + \sqrt[3]{8 \times 4}$

2

$$= \frac{3}{2} \times 4 \sqrt[3]{4} + \frac{12}{2 \sqrt[3]{2}} + 2 \sqrt[3]{4}$$

$$= 6 \sqrt[3]{4} + \frac{12 \times \sqrt[3]{4}}{2 \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{4}}$$

$$= 6 \sqrt[3]{4} + \frac{12 \times \sqrt[3]{4}}{2 \times \sqrt[3]{8}}$$

$$= 6 \sqrt[3]{4} + \frac{12 \times \sqrt[3]{4}}{2 \times 2}$$

$$= 6 \sqrt[3]{4} + 3 \sqrt[3]{4} + 2 \sqrt[3]{4} = 11 \sqrt[3]{4}$$

▶ $\frac{3}{2} \sqrt[3]{64 \times 4} + \frac{12 \times \sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{16} \times \sqrt[3]{4}} + \sqrt[3]{8 \times 4}$

حل آخر:

$$= \frac{3}{2} \times 4 \sqrt[3]{4} + \frac{12 \times \sqrt[3]{4}}{4} + 2 \sqrt[3]{4}$$

$$= 6 \sqrt[3]{4} + 3 \sqrt[3]{4} + 2 \sqrt[3]{4} = 11 \sqrt[3]{4}$$

▶ $3^{x+1} = 3^x \times 3 = 5 \times 3 = 15$

(أ) 3

▶ $3^{x-1} = 3^x \div 3 = 5 \div 3 = \frac{5}{3}$

(ب)

▶ $3^{x+2} + 3^{x+3} = 3^x \times 3^2 + 3^x \times 3^3$

(ج)

$$= 5 \times 9 + 5 \times 27$$

$$= 45 + 135 = 180$$

▶ $12x^3 + 6x^2 - 24x^4 = 6x^2(2x + 1 - 4x^2)$

(أ) 4

▶ $x(x-1) + 5(1-x) = x(x-1) - 5(x-1)$

(ب)

$$= (x-1)(x-5)$$

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (3)

اختبار شهر اكتوبر





اختبارات تراكمية

على الدرس الأول الوحدة الأولى

1 اختبار تراكمي

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 العدد الغير نسبي من الأعداد التالية هو

(أ) $\frac{1}{2}$ (ب) $\sqrt{64}$ (ج) $\sqrt[3]{15}$ (د) 0.45

2 إذا كان : $\sqrt{12} < X < X + 1$ فإن X تساوى حيث X عددًا صحيحًا.

(أ) 3.4 (ب) 3 (ج) 4 (د) -3

3 $\sqrt{16}$ $\sqrt[3]{65}$

(أ) $<$ (ب) $>$ (ج) $\leq$ (د) $=$

4 $\sqrt[3]{35} \approx$ (لأقرب جزء من مائة)

(أ) 3.27 (ب) 3.3 (ج) 3.28 (د) 3.2

5 العدد الغير نسبي الذى يقع بين 4 ، 5 هو

(أ) $4.\bar{3}$ (ب) $-\sqrt{20}$ (ج) $\sqrt[3]{64}$ (د) $\sqrt[3]{100}$

6 طول ضلع المربع الذى مساحته 10 سم² هو سم

(أ) 5 (ب) 2.5 (ج) $\sqrt{10}$ (د) $\sqrt[3]{10}$

2 أوجد مجموعة حل كلاً من المعادلتين الآتيتين في $\mathbb{R}$:

(1) $2x^2 - 5 = 9$ (2) $\frac{1}{3}x^3 + 7 = 6$

3 مكعب مساحته الكلية 234 سم² أوجد طول حرفه لأقرب سنتيمتر.

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 $\mathbb{R} = \dots\dots\dots$

$\mathbb{N} \cup \mathbb{N}$ (د) $]-\infty, \infty[$ (ج) $\mathbb{R}_+ \cup \mathbb{R}_-$ (ب) $\mathbb{R}_+ \cap \mathbb{R}_-$ (أ)

2 إذا كانت x عدداً حقيقياً سالباً فأى من الأعداد الآتية يمثل عدداً موجباً ؟

$\frac{x}{2}$ (د) $2x$ (ج) x^3 (ب) x^2 (أ)

3 $[-3, 1] \cap [0, 4] = \dots\dots\dots$

$]0, 1[$ (د) $[0, 1]$ (ج) $] -3, 4[$ (ب) $[-3, 4]$ (أ)

4 $] -2, 5] \cup \{-2, 3\} = \dots\dots\dots$

$] -2, 5[$ (د) $] -2, 3[$ (ج) $[-2, 5]$ (ب) $[-2, 3]$ (أ)

5 $3 \dots\dots\dots] -3, 3[$

$\not\subset$ (د) $\subset$ (ج) $\notin$ (ب) $\in$ (أ)

6 $[2, 5] -]2, 5[= \dots\dots\dots$

$]2, 5]$ (د) $\{2, 5\}$ (ج) $]2, 5[$ (ب) $[2, 5]$ (أ)

2 إذا كانت : $X = [-1, 4]$ ، $Y =]0, 6]$

1 اكتب X ، Y بطريقة الصفة المميزة. 2 مثل X ، Y على خط الأعداد.

3 أوجد $X - Y$ فى صورة فترة.

3 إذا كانت : $A = [-2, 5]$ ، $B = [3, \infty[$

أوجد مستعيناً بخط الأعداد كلاً من :

2 $A \cap B$

1 $A \cup B$

3 $B - A$

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 $5\sqrt{5} - 3\sqrt{5} = \dots\dots\dots$

(أ) $2\sqrt{10}$ (ب) $2\sqrt{5}$ (ج) $-2\sqrt{5}$ (د) $-2\sqrt{10}$

2 $\frac{6}{\sqrt{3}} = \dots\dots\dots$

(أ) $\sqrt{2}$ (ب) 2 (ج) $2\sqrt{3}$ (د) $6\sqrt{3}$

3 $[-1, 5] - [-4, 0] = \dots\dots\dots$

(أ) $[-4, -1]$ (ب) $[0, 5]$ (ج) $]0, 5[$ (د) $] -4, -1[$

4 المستطيل الذي بعده $(\sqrt{7} + 1)$ سم ، $(\sqrt{7} - 1)$ سم مساحته

هي سم²

(أ) 8 (ب) 7 (ج) 6 (د) $2\sqrt{7}$

5 $\mathbb{Q} \cup \mathbb{Q} = \dots\dots\dots$

(أ) zero (ب) $\mathbb{Z}$ (ج) $\mathbb{R}$ (د) $\emptyset$

6 المعكوس الضربي للعدد : $\frac{2\sqrt{3}}{5}$ هو

(أ) $\frac{5}{\sqrt{3}}$ (ب) $\frac{6}{5\sqrt{3}}$ (ج) $\frac{6}{\sqrt{3}}$ (د) $\frac{5\sqrt{3}}{6}$

2 إذا كان : $x = 3 + \sqrt{7}$ ، $y = \frac{2}{3 + \sqrt{7}}$ أوجد قيمة : $\frac{x+y}{xy}$

3 إذا كانت : $B = [-2, 3[$ ، $A =]-\infty, 1[$ أوجد :

$A \cup B$ 2

$A \cap B$ 1

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 $\sqrt{112} + \sqrt{343} = \dots\dots\dots$

$3\sqrt{7}$ (د) $4\sqrt{7}$ (ج) $11\sqrt{7}$ (ب) $7\sqrt{7}$ (ا)

2 $\sqrt[3]{38} = \dots\dots\dots$

3.38 (د) 3.37 (ج) 3.3 (ب) 3.36 (ا)

3 إذا كان : $\sqrt{125} \times \sqrt{8} = 10\sqrt{a}$ فإن : $a = \dots\dots\dots$

10 (د) 5 (ج) 20 (ب) 40 (ا)

4 إذا كان : $x = \sqrt{5} + \sqrt{6}$ ، $y = \sqrt{5} - \sqrt{6}$ فإن : $x^2 - y^2 = \dots\dots\dots$

$4\sqrt{30}$ (د) $-4\sqrt{30}$ (ج) 11 (ب) 22 (ا)

5 $\frac{3}{\sqrt{7}-2} = \dots\dots\dots$

$3(\sqrt{7}+2)$ (د) $3(\sqrt{7}-2)$ (ج) $\sqrt{7}+2$ (ب) $\frac{\sqrt{7}-2}{3}$ (ا)

6 $]-2, 5[\cap [-2, 5] = \dots\dots\dots$

$\emptyset$ (د) $[-2, 5]$ (ج) $\{-2, 5\}$ (ب) $]-2, 5[$ (ا)

2 اختصر لأبسط صورة :

1 $\frac{1}{3} \sqrt{162} + \sqrt{72} - \sqrt{18} - \sqrt{50}$

2 $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2 - (\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3})$

3 إذا كان : $x = \sqrt{7} + 2$ ، $y = \frac{3}{x}$ أوجد قيمة : $x + y$

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 $\sqrt[3]{128} + \sqrt[3]{16} - 2\sqrt[3]{54} = \dots\dots\dots$

- (أ) صفر (ب) 1 (ج) -1 (د) 2

2 إذا كان : $(X+2)^0 = 1$ فإن : $X \in \dots\dots\dots$

- (أ) $\mathbb{R}$ (ب) $\mathbb{R} - \{-2\}$ (ج) $\mathbb{R} - \{2\}$ (د) $\{-2\}$

3 إذا كان ثلاثة أمثال عدد هو 3^3 فإن : $\frac{2}{3}$ من هذا العدد تساوى

- (أ) 3 (ب) 6 (ج) 21 (د) 9

4 المعكوس الضربي للعدد $(2-\sqrt{3})$ هو

- (أ) $2+\sqrt{3}$ (ب) $-2-\sqrt{3}$ (ج) $\sqrt{3}-2$ (د) $-2+\sqrt{3}$

5 $\left(\frac{3}{2\sqrt{3}}\right)^{-2} = \dots\dots\dots$

- (أ) $\frac{4}{\sqrt{3}}$ (ب) $\frac{3}{4}$ (ج) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ (د) $\frac{4}{3}$

6 $[1, 4] -]-2, 2[= \dots\dots\dots$

- (أ) $]2, 4[$ (ب) $]2, 4]$ (ج) $[2, 4[$ (د) $[2, 4]$

2 إذا كانت : $3^x = 7$ فأوجد القيمة العددية لكل من :

1 3^{x+1} 2 3^{x-1}

3 $3^{x+2} + 3^{x+3}$

3 إذا كانت : $x = \sqrt{7} - \sqrt{3}$ ، $y = \frac{4}{\sqrt{7} - \sqrt{3}}$ أوجد قيمة : $(x+y)^2$



تقييم الوحدة الأولى من الكتاب المدرسى

◀ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 إذا كانت : $a = 2 \sqrt[3]{\frac{1}{4}} - \frac{1}{2} \sqrt[3]{16}$ فما قيمة a ؟

- (أ) -1 (ب) 1 (ج) $\sqrt[3]{2}$ (د) 0

2 ما الفترة التى تمثل $\mathbb{R} \cap]-2, 3]$ ؟

- (أ) $]0, 3]$ (ب) $]-2, 0]$ (ج) $]-2, 1]$ (د) $]0, 3]$

3 إذا كان : $\sqrt{3} = (\sqrt{2})^{x-1}$ فما قيمة $(\sqrt{2})^x$ ؟

- (أ) $\frac{1}{2} \sqrt{6}$ (ب) $\frac{1}{2} \sqrt{3}$ (ج) $\sqrt{6}$ (د) $\frac{1}{6} \sqrt{6}$

4 أى من الأعداد الآتية عدد غير نسبي ؟

- (أ) $\sqrt[3]{-27}$ (ب) $-\sqrt{2 \frac{1}{4}}$ (ج) $0.\bar{5}$ (د) $3 \sqrt{\frac{1}{3}}$

◀ أكمل كلاً مما يأتى بالإجابة الصحيحة :

5 مجموعة الحل للمعادلة : $x^2 + 2 = 0$ فى $\mathbb{R}$ هى

6 إذا كان n عدداً صحيحاً ، $n + 1 > \sqrt{29} > n$ فإن : $n =$

7 المعكوس الضربى للعدد $\sqrt{10} - 3$ فى أبسط صورة يساوى

8 إذا كانت : $[-\infty, -1]$ فإن الفترة التى تعبر عن مكملة X تساوى

◀ أجب عن الأسئلة الآتية :

9 اختصر لأبسط صورة المقدار : $\frac{(\sqrt{15})^{n-2} \times (\sqrt{6})^n}{2 \times (\sqrt{10})^{n-2}}$ ثم أوجد القيمة العددية للنتيجة عند $n = 1$

10 إذا كانت : $x = \sqrt{7} - \sqrt{6}$ فأوجد فى أبسط صورة $x - \frac{1}{x}$

11 إذا كانت : $A =]-\infty, 1]$ ، $B =]-2, 2]$ فأوجد على صورة فترة $B - A$

12 رتب تصاعدياً الأعداد : $2\sqrt{3}$ ، 3.5 ، $3 \frac{1}{2}$

اختبار تراكمي 6 حتى الدرس الأول الوحدة الثانية

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 $25 a b + 15 a^2 b = \dots\dots\dots (5 + 3 a)$

(د) 5 (ج) $5 a b$ (ب) $5 a^2 b$ (أ) $5 a b^2$

2 $x^2 (3 a - b) - y (b - 3 a) = (3 a - b) (\dots\dots\dots)$

(د) $y^2 - x$ (ج) $y - x^2$ (ب) $x^2 - y$ (أ) $x^2 + y$

3 $\sqrt[3]{16} = \dots\dots\dots$

(د) $4\sqrt{2}$ (ج) $4\sqrt[3]{3}$ (ب) $2\sqrt{2}$ (أ) $2\sqrt[3]{2}$

4 $\left(\frac{\sqrt{3}}{6}\right)^{-1} = \dots\dots\dots$

(د) $2\sqrt{3}$ (ج) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (ب) $\sqrt{6}$ (أ) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

5 مجموعة حل المعادلة : $x^3 - 5 x^2 = 0$ في $\mathbb{R}$ هي

(د) $\{0\}$ (ج) $\{5\}$ (ب) $\{0, 5\}$ (أ) $\{-5, 5\}$

6 $(\sqrt{5} - \sqrt{2})^2 = \dots\dots\dots$

(د) $7 - \sqrt{10}$ (ج) $7 + 2\sqrt{10}$ (ب) $2\sqrt{10} - 7$ (أ) $7 - 2\sqrt{10}$

2 حلل كثيرات الحدود الآتية بإخراج العامل المشترك الأكبر :

1 $12 x^3 y^4 + 18 x^2 y^2 - 24 x y^3$

2 $(2 x + 5)^2 - 4 (2 x + 5)$

3 اختصر المقدار : $\frac{(\sqrt{12})^2 \times (3\sqrt{3})^3}{(6\sqrt{3})^3}$ إلى أبسط صورة.



اختبارات شهر أكتوبر

اختبار 1

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 أى من الأعداد التالية عدد غير نسبي يقع بين 2 , 3 ؟

- (أ) 2.5 (ب) $\sqrt{10}$ (ج) $\sqrt{6.25}$ (د) $\sqrt[3]{9}$

2 إذا كانت : $a \in]-1, 3]$ فإن : a يمكن أن تساوى أيًا مما يلي ؟

- (أ) -1 (ب) 0 (ج) 2 (د) 3

3 المعكوس الضربي للعدد : $\sqrt{3} - 2$ هو

- (أ) $2 - \sqrt{3}$ (ب) $\sqrt{3} + 2$ (ج) $-\sqrt{3} - 2$ (د) $\sqrt{3} - 2$

4 إذا كان : $\sqrt{7} = \sqrt{28} + x$ ، فما قيمة x ؟

- (أ) $\sqrt{21}$ (ب) $-\sqrt{21}$ (ج) $\sqrt{7}$ (د) $-\sqrt{7}$

5 إذا كان : $(\sqrt{6})^x \times (\sqrt{6}) = 1$ ، فما قيمة x ؟

- (أ) 0 (ب) 1 (ج) -1 (د) -2

6 إذا كان : $x^2 + ax + 15 = (x + 3)(x + b)$ ، فما قيمة ab ؟

- (أ) 5 (ب) 8 (ج) 13 (د) 40

2 حلل كلاً مما يأتي تحليلًا تامًا :

1 $x^2 - 7x + 12$

2 $-7k - 49m$

3 إذا كانت : $x = \frac{1}{\sqrt{3} + 2}$ ، $y = \sqrt{3} + 2$ فأوجد في أبسط صورة قيمة : $(x + y)^2$

اختبار 2

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 أي مما يلي يمثل تحليل كثيرة الحدود : $x^2 + x - 20$ ؟

(أ) $(x-4)(x+5)$ (ب) $(x+4)(x+5)$

(ج) $(x-4)(x-5)$ (د) $(x+4)(x-5)$

2 $6a - 8b = \dots\dots\dots$

(أ) $6(a-2b)$ (ب) $4(2a-4b)$ (ج) $2(3a-4b)$ (د) $14(a-b)$

3 $\left(\frac{7}{\sqrt{7}}\right)^0 - \frac{7}{(\sqrt{7})^0} = \dots\dots\dots$

(أ) 0 (ب) 6 (ج) 1 (د) -6

4 $\sqrt{18} + \sqrt{32} = \dots\dots\dots$

(أ) $\sqrt{50}$ (ب) $7\sqrt{2}$ (ج) $7\sqrt{4}$ (د) $5\sqrt{4}$

5 إذا كان : $a + \sqrt{5} = 0$ فما قيمة a ؟

(أ) 0 (ب) $\sqrt{5}$ (ج) $-\sqrt{5}$ (د) $\frac{1}{\sqrt{5}}$

6 $\{2\} \cup]2, 5[= \dots\dots\dots$

(أ) $]2, 5[$ (ب) $[2, 5]$ (ج) $]2, 5]$ (د) $[2, 5[$

2 إذا كانت : $A = [-1, 3]$ ، $B =]-\infty, 3[$ فأوجد ما يلي :

$B \setminus A$ 2

$A \cap B$ 1

3 حل كلاً مما يأتي تحليلًا تامًا :

1 $x^2 y^3 + x^2 y^2 + x^3 y^2$

2 $3a^2 - 6a - 9$

اختبار 3

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 إذا كان : $x \in \mathbb{Z}$ ، $x < \sqrt{29} < x + 1$ ، فما قيمة x ؟

- (أ) 4 (ب) 5 (ج) 6 (د) 7

2 إذا كان : $a = 4\sqrt[3]{5} + 3$ ، فإن :

- (أ) $a = 1$ (ب) $a = \sqrt{5}$ (ج) $a = \sqrt[3]{5}$ (د) $a = 5$

3 أى الفترات الآتية ينتمى إليها العدد $-\sqrt{7}$ ؟

- (أ) $[-2, -1]$ (ب) $[-3, -2]$ (ج) $[-4, -3]$ (د) $[-7, -6]$

4 إذا كانت : $2^x = 3$ ، فما قيمة 2^{x+1} ؟

- (أ) 4 (ب) 5 (ج) 6 (د) 9

5 إذا كان : $(x-3)(x+5) = 0$ ، فأى مما يلي صحيح ؟

- (أ) $x = 3$ أو $x = 5$ (ب) $x = 3$ أو $x = -5$

- (ج) $x = -3$ أو $x = 5$ (د) $x = -3$ أو $x = -5$

6 إذا كان : $a - b = 7$ ، $x + y = 10$ ، فإن : $x(a-b) - y(b-a) = \dots\dots\dots$

- (أ) 3 (ب) 17 (ج) 51 (د) 70

2 أوجد مجموعة حل كل من المعادلات الآتية في $\mathbb{R}$:

1 $x^2 = 5x$ 2 $(x-5)(3x+2) = 0$

3 $m^2 - 14m + 45 = 0$

3 أوجد ناتج كل مما يأتى فى أبسط صورة :

1 $(\sqrt{7}-1)^2 + (\sqrt{7}+2)(\sqrt{7}-3)$

2 $2\sqrt{5} - 3\sqrt[3]{2} + 4\sqrt{5} + \sqrt[3]{2}$

حمل الآن


مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (4)

اختبار شهر اكتوبر



8 إذا كان x ، y عددين صحيحين متتاليين ، فما قيمة $x + y$ ؟



- 11 (A) 13 (B) 15 (C) 17 (D)

9 إذا كانت $a \in]2, 5[$ فإن a يمكن أن تساوي أيًا مما يلي ؟

- 1 (A) 2 (B) 4 (C) 5 (D)


10 إذا كانت $a \notin]-1, 3[$ فإن a يمكن أن تساوي أيًا مما يلي ؟

- 1 (A) 0 (B) 2 (C) 3 (D)

11 إذا كانت $x = [-5, 7[$ ، فأأي مما يلي صحيح ؟

- $-5 \notin X$ (A) $7 \in X$ (B)
 $-2 \in X$ (C) $0 \notin X$ (D)

12 أي مما يلي يمثل $X \cap Y$ ؟



- $\emptyset$ (A) $\{5\}$ (B)
 $[3, 7[$ (C) $[3, 5[$ (D)

13 ما الفترة الناتجة عن $]2, 5[\cup \{2\}$ ؟

- $]2, 5[$ (A) $[2, 5[$ (B)
 $[2, 5[$ (C) $]2, 5]$ (D)

14 أي الفترات الآتية ينتمي إليها العدد $-\sqrt{7}$ ؟

- $[-2, -1]$ (A) $[-3, -2]$ (B)
 $[-4, -3]$ (C) $[-7, -6]$ (D)

15 إذا كان: $a + \sqrt{5} = 0$ فما قيمة a ؟

- 0 (A) $\sqrt{5}$ (B) $-\sqrt{5}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ (D)

مراجعة اختبار

شهر اكتوبر 2 ع

أول أسئلة الاختيار من متعدد

1 أي من الأعداد التالية عدد غير نسبي ؟

- $\sqrt[3]{-125}$ (A) $\sqrt{5}$ (B) $\sqrt{\frac{9}{25}}$ (C) $0.\bar{3}$ (D)

2 إذا كان: $x < \sqrt{29} < x + 1$ ، $x \in \mathbb{Z}$ فما

قيمة x ؟

- 4 (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D)

3 ما تقدير العدد $\sqrt{41}$ لأقرب عدد صحيح ؟

- 6 (A) 7 (B) 36 (C) 49 (D)

4 ما تقدير العدد $\sqrt[3]{25}$ لأقرب عدد صحيح ؟

- 2 (A) 3 (B) 5 (C) 12.5 (D)

5 أي من الأعداد التالية عدد غير نسبي يقع بين 3 ،

2 ؟

- $2.\bar{5}$ (A) $2\frac{1}{3}$ (B) $\sqrt{6.25}$ (C) $\sqrt[3]{9}$ (D)


6 إذا كان: $1 < \sqrt{n} < 2$ فأأي مما يلي قيمة

محتملة للعدد n ؟

- 1 (A) 2 (B) 4 (C) 8 (D)

7 أي من الأعداد التالية تمثله النقطة k على خط

الأعداد التالي ؟



- $\sqrt{78}$ (A) $\sqrt{81}$ (B) $\sqrt{96}$ (C) $\sqrt{86}$ (D)

26 أي مما يلي يكافئ $\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}}$ ؟

- Ⓐ $2\sqrt{6}$ Ⓑ $6\sqrt{2}$ Ⓒ 6 Ⓓ $\sqrt{70}$

27 أي مما يلي يكافئ $\frac{\sqrt{25}}{\sqrt{15}}$ ؟

- Ⓐ $\frac{5}{15}$ Ⓑ $\frac{5}{3}$ Ⓒ $\frac{\sqrt{5}}{3}$ Ⓓ $\frac{\sqrt{15}}{3}$

28 إذا كان: $\sqrt{160} = x\sqrt{10}$ فما قيمة x ؟

- Ⓐ 8 Ⓑ 6 Ⓒ 4 Ⓓ 3

29 إذا كان: $a\sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{10}$ فما قيمة a ؟

- Ⓐ 30 Ⓑ $\sqrt[3]{30}$ Ⓒ 15 Ⓓ $\sqrt[3]{15}$

30 إذا كان: $2\sqrt{3} \times 4a = 8\sqrt{6}$ فما قيمة a ؟

- Ⓐ $\sqrt{2}$ Ⓑ $\sqrt{3}$ Ⓒ 2 Ⓓ $\sqrt{6}$

31 إذا كان: $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}}$ فما قيمة a ؟

- Ⓐ $\sqrt{3}$ Ⓑ $\sqrt{6}$ Ⓒ 3 Ⓓ 9

32 إذا كان: $x + \sqrt{28} = \sqrt{7}$ فما قيمة x ؟

- Ⓐ $\sqrt{21}$ Ⓑ $-\sqrt{21}$ Ⓒ $\sqrt{7}$ Ⓓ $-\sqrt{7}$

33 ما ناتج $\frac{(ab)^3}{b^3}$ ؟

- Ⓐ a^3 Ⓑ $\frac{a}{b}$ Ⓒ $\frac{a^3}{b^2}$ Ⓓ $\frac{a^2}{b^3}$

34 ما قيمة $(\frac{7}{\sqrt{7}})^0 - \frac{7}{(\sqrt{7})^0}$ ؟

- Ⓐ 0 Ⓑ 6 Ⓒ 1 Ⓓ -6

35 ما ناتج $(\sqrt{3})^3 \times (\sqrt{3})^{-4}$ ؟

- Ⓐ $\sqrt{3}$ Ⓑ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ Ⓒ 3 Ⓓ $\frac{1}{3}$

36 ما ناتج $(\frac{\sqrt{5}}{10})^{-1}$ ؟

- Ⓐ $2\sqrt{5}$ Ⓑ $5\sqrt{2}$ Ⓒ $\frac{5}{\sqrt{10}}$ Ⓓ 2

16 إذا كان: $a\sqrt{2} = 1$ فما قيمة a ؟

- Ⓐ 1 Ⓑ $\sqrt{2}$ Ⓒ $-\sqrt{2}$ Ⓓ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

17 ما قيمة: $\sqrt{3} + \sqrt{3}$ ؟

- Ⓐ $\sqrt{3}$ Ⓑ $2\sqrt{3}$ Ⓒ $\sqrt{6}$ Ⓓ 3

18 إذا كان: $\sqrt{5} - 4\sqrt{5} = 3\sqrt{3}$ فإن:

- Ⓐ $a = -1$ Ⓑ $a = 1$ Ⓒ $a = 7$ Ⓓ $a = 10$

19 إذا كان: $(2\sqrt{3})^n = 12$ فإن:

- Ⓐ $n = 2$ Ⓑ $n = 3$ Ⓒ $n = 4$ Ⓓ $n = 6$

20 إذا كان: $\sqrt[3]{5} + 3a = 4\sqrt[3]{5}$ فإن:

- Ⓐ $a = 1$ Ⓑ $a = \sqrt{5}$ Ⓒ $a = \sqrt[3]{5}$ Ⓓ $a = 5$

21 ما المعكوس الجمعي للعدد $\frac{7}{\sqrt{7}}$ في أبسط صورة؟

- Ⓐ $\frac{\sqrt{7}}{7}$ Ⓑ $-\frac{\sqrt{7}}{7}$ Ⓒ $-\sqrt{7}$ Ⓓ $-\frac{7}{\sqrt{7}}$

22 ما المعكوس الضربي للعدد: $\sqrt{3} - 2$

- Ⓐ $2 - \sqrt{3}$ Ⓑ $-\sqrt{3} - 2$ Ⓒ $\sqrt{3} + 2$ Ⓓ $\sqrt{3} - 2$

23 أي مما يلي صحيح ؟

- Ⓐ $\sqrt{32} = 8\sqrt{2}$ Ⓑ $\sqrt{40} = 4\sqrt{10}$ Ⓒ $\sqrt{48} = 3\sqrt{6}$ Ⓓ $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

24 ما قيمة: $\sqrt{18} + \sqrt{32}$ ؟

- Ⓐ $5\sqrt{4}$ Ⓑ $7\sqrt{2}$ Ⓒ $7\sqrt{4}$ Ⓓ $\sqrt{50}$

25 أي مما يلي يكافئ $\sqrt[3]{5} \times \sqrt[3]{25}$ ؟

- Ⓐ $\sqrt[3]{30}$ Ⓑ 5 Ⓒ $5\sqrt[3]{5}$ Ⓓ 125

$$x(a+b) + y(a+b) = \dots\dots [47]$$

- $(x+y)(a+b)$ Ⓐ $(x-y)(a-b)$ Ⓔ
 $(x+y)(a-b)$ Ⓔ $(x-y)(a+b)$ Ⓐ

$$[48] \text{ إذا كان } x+y=10, a-b=7 \text{ فإن:}$$

$$x(a-b) - y(b-a) = \dots\dots$$

- 70 Ⓐ 51 Ⓐ 17 Ⓐ 3 Ⓐ

$$[49] \text{ أي مما يلي يمثل تحليل كثيرة الحدود}$$

$$x^2 + x - 20$$

- $(x+4)(x+5)$ Ⓐ $(x-4)(x+5)$ Ⓔ
 $(x+4)(x-5)$ Ⓔ $(x-4)(x-5)$ Ⓐ

$$[50] \text{ أي المخططات الآتية يمثل تحليل كثيرة الحدود:}$$

$$9x^2 - 9x - 4$$

$$\begin{array}{r} (3x-2) \\ \times (3x+2) \\ \hline \end{array}$$

Ⓐ

$$\begin{array}{r} (3x-4) \\ \times (3x+1) \\ \hline \end{array}$$

Ⓔ

$$\begin{array}{r} (9x-4) \\ \times (x+1) \\ \hline \end{array}$$

Ⓐ

$$\begin{array}{r} (9x-1) \\ \times (x+4) \\ \hline \end{array}$$

Ⓐ

$$[52] \text{ إذا كان:}$$

$$x^2 + ax + 15 = (x+3)(x+b)$$

$$\text{فما قيمة } ab$$

- 40 Ⓐ 13 Ⓐ 8 Ⓐ 5 Ⓐ

$$[53] \text{ إذا كان:}$$

$$x^2 - 11x + 28 = (x-a)(x-b)$$

$$\text{فما قيمة } a+b$$

- 16 Ⓐ 11 Ⓐ -11 Ⓐ -16 Ⓐ

$$[37] \text{ ما محيط المربع الذي مساحته } a^2 \text{ سم}^2$$

- a^4 سم Ⓐ $(\sqrt{a})^4$ سم Ⓐ
 $4a$ سم Ⓐ $4\sqrt{a}$ سم Ⓐ

$$[38] \text{ ما قيمة } 4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2$$

- 4^{16} Ⓐ 4^8 Ⓐ 4^3 Ⓐ 4^2 Ⓐ

$$[39] \text{ إذا كان: } 2^{x-1} = 1 \text{ فما قيمة } x$$

- 2 Ⓐ -1 Ⓐ 1 Ⓐ 0 Ⓐ

$$[40] \text{ إذا كان: } (\sqrt{6})^x \times \sqrt{6} = 1 \text{ فما قيمة } x$$

- 2 Ⓐ -1 Ⓐ 1 Ⓐ 0 Ⓐ

$$[41] \text{ ما العدد } \frac{1}{5} \text{ من } (\sqrt[3]{5})^6$$

- $(\sqrt[3]{5})^8$ Ⓐ $\sqrt[3]{5}$ Ⓐ 25 Ⓐ 5 Ⓐ

$$[42] \text{ إذا كانت: } 2^x = 3 \text{ فما قيمة } 2^{x+1}$$

- 9 Ⓐ 6 Ⓐ 5 Ⓐ 4 Ⓐ

$$[43] \text{ ما العامل المشترك الأكبر بين حدود كثيرة الحدود}$$

$$12x^2 - 8x$$

- $4x$ Ⓐ $2x$ Ⓐ 4 Ⓐ 2 Ⓐ

$$[44] \text{ أي مما يلي يمثل تحليلاً لكثيرة الحدود}$$

$$16x^2 - 24x^3 \text{ باخراج ع. م. أ.}$$

- $4x^2(4-6x)$ Ⓐ $8x(2x-3x^2)$ Ⓐ
 $8(2x^2-3x^3)$ Ⓐ $8x^2(2-3x)$ Ⓐ

$$[45] 6a - 8b = \dots\dots$$

- $4(2a-4b)$ Ⓐ $6(a-2b)$ Ⓐ
 $14(a-b)$ Ⓐ $2(3a-4b)$ Ⓐ

$$[46] x^2y - xy^2 = \dots\dots$$

- $x^2y(1-y)$ Ⓐ $xy(x-y)$ Ⓐ
 $xy(y-x)$ Ⓐ $xy^2(x-1)$ Ⓐ

3] إذا كانت $x =]-2, 2[$ ، $y = [1, 4]$

، أوجد مستعينا بخط الأعداد :

$$x \cap y, x \cup y, y - x, x - y$$

4] إذا كانت $A =]-5, \infty[$ ، $B =]-\infty, 2]$

، أوجد مستعينا بخط الأعداد :

$$\bar{A}, B - A, A - B, A \cap B, A \cup B$$

5] إذا كانت $A = [-1, 3]$ ، $B =]-\infty, 3[$

، فأوجد :

$$\bar{B}, A \cap B, A \cup B, B - A, A - B$$

6] أوجد كلا مما يأتي :

$$[2, 5[\cup]-2, 3]$$
 (1)

$$[2, 7] - [3, 8[$$
 (2)

$$]-1, 3[\cap]-5, 1]$$
 (3)

$$[4, 8[$$
 (4)

$$[3, \infty[\cap]-\infty, 7[$$
 (5)

$$]2, 5] \cup]5, \infty[$$
 (6)

7] أوجد كلا مما يأتي :

$$R \cap [2, 5[$$
 (1)

$$R^+ \cup]0, 2]$$
 (2)

$$R^- - [-2, 0[$$
 (3)

54] إذا كان: $(x - 5)$ أحد عاملي ثلاثية الحدود

$(2x^2 - 7x - 15)$ فما العامل الآخر؟

$$2x - 3$$
 (أ)

$$x + 3$$
 (ب)

$$x - 3$$
 (ج)

$$2x + 3$$
 (د)

55] إذا كان: $3x - 2y = 6$ ، $2x + 3y = 5$

، فما القيمة العددية لكثيرة الحدود

$$(6x^2 + 5xy - 6y^2) ?$$

$$30$$
 (أ)

$$12$$
 (ب)

$$11$$
 (ج)

$$10$$
 (د)

أجب عما يلي

ثانيا

1] أوجد في $\mathbb{R}$ مجموعة الحل لكل من المعادلات الآتية:

$$x^3 - 11 = 5$$
 (1)

$$2x^3 + 13 = 67$$
 (2)

$$\frac{2}{3}x^2 = \frac{4}{15}$$
 (3)

$$3x^2 - 1 = -13$$
 (4)




2] أوجد في $\mathbb{Q}$ مجموعة الحل لكل من المعادلات الآتية:

$$2x^2 - 3 = 9$$
 (1)

$$6x^2 - 3 = 4x^2 + 7$$
 (2)

$$2(x^3 + 1) = 18$$
 (3)

12 أوجد مساحة كل من الأشكال الآتية في أبسط صورة:



13 اختصر كلا مما يأتي إلى أبسط صورة :

(1) $3\sqrt{\frac{1}{3}} - \sqrt{27}$

(2) $2\sqrt[3]{\frac{1}{4}} + \sqrt[3]{16}$

(3) $\frac{2\sqrt[3]{5} \times \sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{10}}$

(4) $\frac{\sqrt{98} + \sqrt{8}}{\sqrt{18}}$

(5) $\frac{3\sqrt[3]{32} - 3\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{4}}$

(6) $3\sqrt{8} + \sqrt{18} - \sqrt{32}$

(7) $4\sqrt{48} + \frac{4}{3}\sqrt{27} + \sqrt{75}$

8 أوجد كلا مما يأتي:

(1) $N \cap [-3, 0[$

(2) $Z^+ \cap]-1, 2[$

(3) $Z^- \cap]-2, 3]$

(4) $\{3, 5\} \cup]3, 5[$

(5) $\{3, 7\} \cap [3, 7[$

(6) $[2, 5] - \{2, 5\}$

(7) $[0, 5] - \{5\}$

9 أوجد ناتج كل مما يأتي في أبسط صورة:

(1) $(\sqrt[3]{5})^3 \times 2\sqrt{3}$

(2) $\sqrt{5}(2 - \sqrt{5}) - 2(1 + \sqrt{5})$

(3) $(\sqrt{7} - 1)^2 + (\sqrt{7} + 2)(\sqrt{7} - 3)$

(4) $(3 + 2\sqrt{2})^2 - \sqrt{2}(1 - \sqrt{2})$

10 إذا كانت: $x = \frac{1}{\sqrt{3}+2}$ ، $y = \sqrt{3} + 2$ ،

فاوجد قيمة كل مما يأتي في أبسط صورة:

$x^2 + y^2$ ، xy ، $(x+y)^2$

11 إذا كان: $\frac{x}{3\sqrt{2}} = \frac{y}{2\sqrt{3}} = 1$ ، فاوجد قيمة $x^2 + y^2$

$$\frac{(2)^{2n+1} \times (3)^{2n+1}}{(6)^{2n}} \quad (6)$$

18 اختصر كلا مما يأتي لأبسط صورة:

$$(1) \quad \frac{(\sqrt{6})^{n+2} \times (\sqrt{3})^n}{4 \times (\sqrt{2})^{n-2}} \quad \text{ثم اوجد قيمة الناتج عند } n = 1$$

$$(2) \quad \frac{10^{-n} \times 0.01}{10^{-n-6} \times 10^n} \quad \text{ثم اوجد قيمة الناتج عند } n = 3$$

$$(19) \quad \text{إذا كانت: } x = \sqrt{2} \text{ ، } y = \sqrt{6}$$

$$\text{فما قيمة } \frac{y^6 x^{-4}}{x^2} ?$$

$$(20) \quad \text{إذا كانت } x = 2\sqrt{3} \text{ ، } y = 3\sqrt{2}$$

$$\text{فاوجد القيمة العددية للمقدار } (x^2 - y^2)^{-1}$$

$$(21) \quad \text{إذا كانت: } 2^x = 5 \quad \text{فاوجد قيمة كل من:}$$

$$2^{x+2} + 2^{x+3} \text{ ، } 2^{1-x} \text{ ، } 2^{x+1}$$

(22) حل كثيرات الحدود الآتية باخراج العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ):

$$(1) \quad 2a - 4ab - 6abc$$

$$(2) \quad x^2 y^3 + x^2 y^2 + x^3 y^2$$

$$(3) \quad 9a^2 b - 6ab^2 + 3ab$$

$$(4) \quad -4x^5 + 6x^4 - 8x^3 + 12x^2$$

$$(8) \quad \sqrt[3]{192} - 3\sqrt[3]{375} + 2\sqrt[3]{24}$$

$$(9) \quad \frac{3}{2}\sqrt[3]{256} + \frac{12}{\sqrt[3]{16}} + \sqrt[3]{32}$$

14 في كل مما يأتي أوجد قيمة x :

$$(1) \quad x\sqrt{32} = 2\sqrt{50} + \sqrt{72}$$

$$(2) \quad x\sqrt[3]{10} = \sqrt[3]{80} - \sqrt[3]{270}$$

15 اجب عن الاسئلة الآتية:

$$\text{إذا كان: } 4\sqrt{5} = 2\sqrt{a} \text{ ، } 2\sqrt{24} = b\sqrt{6}$$

$$\text{فاوجد } a + b$$

$$(16) \quad \text{إذا كانت: } x = \sqrt{3} + \sqrt{2} \text{ ، } y = \sqrt{3} - \sqrt{2}$$

فاوجد في أبسط صورة كلا مما يأتي:

$$\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \text{ ، } \frac{x}{y} \text{ ، } x \times y$$

17 اختصر كلا مما يأتي لأبسط صورة:

$$(1) \quad \frac{(-2xy)^{-3}}{x^{-4}y^{-3}}$$

$$(2) \quad \frac{-3a^2 b \times 4a^{-1} b^{-2}}{12(ab)^{-2}}$$

$$(3) \quad \left(\frac{2\sqrt{3}}{3\sqrt{2}}\right)^4$$

$$(4) \quad \frac{(\sqrt{3})^3 \times 27}{(\sqrt{3})^5 \times (\sqrt{3})^4}$$

$$(5) \quad \frac{(\sqrt{18})^2 \times (\sqrt{2})^{-1}}{(\sqrt{8})^{-1}}$$

(7) $5x^2 - 4y(7x + 3y)$

(8) $(x + 2)(x - 5) - 8$

(9) $6x^3 - 60x - 2x^2$

(10) $18 - 21x^2 - 9x^4$

(11) $42x^2y^2 - 30x^2y^4 + 12x^2y^3$

26 حل كلا من المعادلات الآتية في R :

(1) $m^2 - 14m + 45 = 0$

(2) $x^2 - 21 = 4x$

(3) $3y^2 + 17y + 10 = 0$

23 حل كثيرات الحدود الآتية بإخراج العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ) :

(1) $a(b + 5) + 2(b + 5)$

(2) $(4x - 1) - y(4x - 1)$

(3) $(2x - 3)^2 - 2(2x - 3)$

(4) $(7x - 5)^2 - 7x + 5$

(5) $(x + 2)^3 - 2(x + 2)^2$

(6) $3x + 6 - (x + 2)^2$

24 اوجد مجموعة حل كل من المعادلات الآتية في R :

(1) $x^2 - x = 0$

(2) $4x^2 + 8x = 0$

(3) $5x - x^2 = 0$

(4) $x^2 = 5x$

(5) $2x^2 - 3x = 0$

(6) $12x^2 - 4x = 0$

25 حل كل مما يأتي تحليلًا تامًا :

(1) $-x^2 + 3x + 40$

(2) $14x - 32 + x^2$

(3) $3x^2 + 6x - 45$

(4) $5n^2 - 20n - 105$

(5) $3a^2 - 6a - 9$

(6) $6x^2 + 7xy - 3y^2$



حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (5)

اختبار شهر اكتوبر



$$[3] \quad 3x^3 + 7 = 31$$

الحل

$$3x^3 = 31 - 7$$

$$3x^3 = 24$$

$$x^3 = 8$$

$$x = \sqrt[3]{8} = 2$$

$$\{2\} = \text{ج. م}$$

$$[4] \quad x^3 - 11 = 28$$

الحل

$$x^3 = 28 + 11$$

$$x^3 = 39$$

$$x = \sqrt[3]{39}$$

$$\{\sqrt[3]{39}\} = \text{ج. م}$$

[2] مستعينا بخط الأعداد المقابل مثل

الفترتين $x = [1, 4]$, $y =]2, 6]$ ثم أوجد:




$$[1] \quad x \cap y = \dots$$

$$[2] \quad x \cup y = \dots$$

$$[3] \quad x - y = \dots$$

الحل



$$x \cap y =]2, 4], x \cup y = [1, 6]$$

$$x - y = [1, 2]$$

مجموعة الأعداد الحقيقية

[1] أوجد في R مجموعة حل المعادلات الآتية:

$$[1] \quad 2x^2 - 1 = 49$$

الحل

$$2x^2 = 49 + 1$$

$$2x^2 = 50$$

$$x^2 = \frac{50}{2}$$

$$x^2 = 25$$

$$x = \pm\sqrt{25} = \pm 5$$

$$\{-5, 5\} = \text{ج. م}$$

$$[2] \quad x^2 - 5 = 2$$

الحل

$$x^2 = 2 + 5$$

$$x^2 = 7$$

$$x = \pm\sqrt{7}$$


$$\{-\sqrt{7}, \sqrt{7}\} = \text{ج. م}$$

5 مستعينا بخط الأعداد مثل الفترتين

$$x = [3, 4], y =]1, 3]$$

$$x - y, x \cup y, x \cap y$$

الحل



$$x \cap y = \{3\}$$

$$x \cup y =]1, 4]$$

$$x - y =]1, 3[$$

6 أوجد في أبسط صورة (العمليات على الجذور)

$$1 (\sqrt{8} - 3)(\sqrt{8} + 3)$$

$$8 - 9 = -1$$

$$2 (\sqrt{3} - 2)^2$$

$$3 - \sqrt{3} \times 2 \times 2 + 4$$

$$= 7 - 4\sqrt{3}$$

$$3 (\sqrt{5} - 1)^2 + (\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2)$$

$$5 - 2\sqrt{5} + 1 + 5 - 4$$

$$= 7 - 2\sqrt{5}$$

$$4 \text{ إذا كان } x = \sqrt{5} + 2, y = \sqrt{5} - 2$$

$$\text{أوجد قيمة : } x^2 + y^2$$


$$x^2 = (\sqrt{5} + 2)^2 = 9 + 4\sqrt{5}$$

$$y^2 = (\sqrt{5} - 2)^2 = 9 - 4\sqrt{5}$$


$$x^2 + y^2 = 18$$

3 مستعينا بخط الأعداد المقابل مثل الفترتين

$$1 y =]2, \infty[, x =]-\infty, 4[$$



$$x', x - y, x \cup y, x \cap y$$



الحل

$$x \cap y =]2, 4[$$

$$x \cup y =]-\infty, \infty[$$

$$x - y =]-\infty, 2[$$

$$x' = [4, \infty[$$

4 أوجد ناتج كل مما يلي

$$\mathbb{R}_- \cap [-2, 4[\quad 2 \quad \mathbb{R}_+ \cup]0, 2] \quad 1$$

$$\mathbb{Z}_+ \cap]-1, 2[\quad 4 \quad \mathbb{N} \cap [-3, 0[\quad 3$$

$$\mathbb{Z}_- \cap]-3, 2[\quad 5$$

الحل

$$]0, 2] \quad 1$$

$$[-2, 0[\quad 2$$

$$\emptyset \quad 3$$

$$\{1\} \quad 4$$

$$\{-2, -1\} \quad 5$$

7 إذا كانت :

$$y = \sqrt{5} - \sqrt{3} , x = \sqrt{5} + \sqrt{3}$$

فاوجد في أبسط صورة كلا مما يأتي :

$$xy \quad (2) \quad (x + y)^2 \quad (1)$$

$$x - y \quad (3)$$

$$(x + y)^2 = (2\sqrt{5})^2 = 20$$

$$xy = 5 - 3 = 2$$

$$x - y = \sqrt{5} - \sqrt{3} - \sqrt{5} - \sqrt{3} \\ = -2\sqrt{3}$$

7 اوجد مساحة الأشكال التالية

1 المربع



$$A = 2\sqrt{5} \times 2\sqrt{5} \\ = 20 \text{ سم}^2$$

2 المستطيل



$$A = (3\sqrt{5} + 2)(3\sqrt{5} - 2) \\ = 45 - 4 = 41 \text{ سم}^2$$

5 اوجد ناتج $(\sqrt{7} - 2)^2 + (\sqrt{7} + 3)(\sqrt{7} - 1)$

في أبسط صورة

الحل

$$(\sqrt{7} - 2)^2 = 7 - 4\sqrt{7} + 4 \\ = 11 - 4\sqrt{7}$$

$$(\sqrt{7} + 3)(\sqrt{7} - 1) \\ = 7 - \sqrt{7} + 3\sqrt{7} - 3 \\ = 4 + 2\sqrt{7}$$

$$\text{المقدار} = 15 - 2\sqrt{7}$$

6 إذا كان $b = \frac{2}{a}$, $a = (\sqrt{7} - \sqrt{5})$

فاوجد في أبسط صورة

$$a - b \quad (2)$$

$$ab \quad (1)$$

الحل

$$b = \frac{2}{\sqrt{7} - \sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{7} + \sqrt{5}}{\sqrt{7} + \sqrt{5}}$$

$$b = \frac{2(\sqrt{7} + \sqrt{5})}{7 - 5} = \sqrt{7} + \sqrt{5}$$

$$ab = (\sqrt{7} - \sqrt{5})(\sqrt{7} + \sqrt{5}) \\ = 7 - 5 = 2$$

$$a - b = (\sqrt{7} - \sqrt{5}) - (\sqrt{7} + \sqrt{5}) \\ = \sqrt{7} - \sqrt{5} - \sqrt{7} - \sqrt{5} \\ = -2\sqrt{5}$$

10] اختصر لأبسط صورة

1] $\sqrt{108} - \sqrt{48} + 2\sqrt{27} + \sqrt{75}$

الحل

$$\begin{aligned} & \sqrt{3 \times 36} - \sqrt{3 \times 16} + 2\sqrt{3 \times 9} + \sqrt{3 \times 25} \\ &= 6\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + 6\sqrt{3} + 5\sqrt{3} \\ &= 13\sqrt{3} \end{aligned}$$

2] $5\sqrt{2} + -\frac{1}{2}\sqrt{200} - (\sqrt[3]{5} \times \sqrt[3]{25})$

الحل

$$\begin{aligned} & 5\sqrt{2} - \frac{1}{2}\sqrt{2 \times 100} - 5 \\ & 5\sqrt{2} - 5\sqrt{2} - 5 = -5 \end{aligned}$$


3] اختصر لأبسط صورة :

$2\sqrt{32} + \sqrt{18} + \sqrt{50}$

الحل

$$\begin{aligned} & 2\sqrt{32} + \sqrt{18} + \sqrt{50} \\ &= 8\sqrt{2} + 3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} \\ &= 16\sqrt{2} \end{aligned}$$

3] مثلث



الحل

$$A = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = 8$$

8] اجعل المقام عدد صحيح

1] $\frac{10}{2\sqrt{5}}$

الحل

$$\frac{10}{2\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{10\sqrt{5}}{10} = \sqrt{5}$$

2] $\frac{10}{5 - \sqrt{15}}$

الحل

$$\begin{aligned} & \frac{10}{5 - \sqrt{15}} \times \frac{5 + \sqrt{15}}{5 + \sqrt{15}} \\ &= \frac{10(5 + \sqrt{15})}{25 - 15} \\ &= \frac{10(5 + \sqrt{15})}{10} = 5 + \sqrt{15} \end{aligned}$$

9] إذا كانت : $x = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$

فأوجد في أبسط صورة قيمة : $x + \frac{1}{x}$

الحل

$$\begin{aligned} \therefore x &= \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} = \\ &= \frac{(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2}{3-2} = 5 - 2\sqrt{6} \\ \therefore \frac{1}{x} &= 5 + 2\sqrt{6} \therefore x + \frac{1}{x} = 10 \end{aligned}$$

$$[2] \sqrt[3]{-16} - \sqrt{28} + \sqrt[3]{54} - \frac{14}{\sqrt{7}}$$

الحل

$$\begin{aligned} & -\sqrt[3]{2 \times 8} - \sqrt{4 \times 7} + \sqrt[3]{2 \times 27} - \frac{14\sqrt{7}}{7} \\ & -2\sqrt[3]{2} - 2\sqrt{7} + 3\sqrt[3]{2} - 2\sqrt{7} \\ & = \sqrt[3]{2} - 4\sqrt{7} \end{aligned}$$

$$[3] \frac{\sqrt{98} + \sqrt{18}}{\sqrt{50}}$$

الحل

$$\frac{\sqrt{2 \times 49} + \sqrt{2 \times 9}}{\sqrt{2 \times 25}}$$

$$\frac{7\sqrt{2} + 3\sqrt{2}}{5\sqrt{2}} = \frac{10\sqrt{2}}{5\sqrt{2}} = 2$$

[12] اختصر لأبسط صورة (الأس)

$$[1] \frac{(\sqrt{5})^5 \times (\sqrt{5})^8}{(\sqrt{5})^4 \times (\sqrt{5})^5}$$

$$= \frac{\sqrt{5}^{13}}{\sqrt{5}^9} = \sqrt{5}^4 = 25$$

$$[2] \frac{(36)^n \times (5)^{2n}}{(30)^{2n}}$$

$$\frac{6^{2n} \times 5^{2n}}{6^{2n} \times 5^{2n}} = 6^0 \times 5^0 = 1$$

$$[4] \sqrt{18} + \sqrt[3]{54} - \sqrt{\frac{216}{12}} - \sqrt[3]{16}$$

الحل

$$\begin{aligned} & \sqrt{2 \times 9} + \sqrt[3]{2 \times 27} - \sqrt{18} - \sqrt[3]{2 \times 8} \\ & 3\sqrt{2} + 3\sqrt[3]{2} - 3\sqrt{2} - 2\sqrt[3]{2} \\ & = \sqrt[3]{2} \end{aligned}$$

$$[5] \sqrt[3]{24} + \sqrt[3]{81} - 5\sqrt[3]{3}$$

الحل

$$\begin{aligned} & \sqrt[3]{3 \times 8} + \sqrt[3]{3 \times 27} - 5\sqrt[3]{3} \\ & 2\sqrt[3]{3} + 3\sqrt[3]{3} - 5\sqrt[3]{3} = \text{صفر} \end{aligned}$$

$$[6] \frac{2^3\sqrt{5} \times \sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{10}}$$

الحل

$$\frac{2^3\sqrt{5} \times \sqrt[3]{27 \times 2}}{\sqrt[3]{10}} = \frac{2^3\sqrt{5} \times 3\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{10}} = \frac{6^3\sqrt[3]{10}}{\sqrt[3]{10}} = 6$$

[11] اوجد قيمة x اذا كان :

$$[1] x^3\sqrt[3]{10} = \sqrt[3]{80} - \sqrt[3]{270}$$

الحل

$$x^3\sqrt[3]{10} = \sqrt[3]{10 \times 8} - \sqrt[3]{10 \times 27}$$

$$x^3\sqrt[3]{10} = 2\sqrt[3]{10} - 3\sqrt[3]{10}$$

$$x^3\sqrt[3]{10} = -\sqrt[3]{10} \quad \therefore x = -1$$

$$[6] 6x^2 - 2x^3 + 6x^4$$

$$2x^2(3 - x + 3x^2)$$

$$[7] a(a + 4) + 3(a + 4)$$

$$(a + 4)(a + 3)$$

[15] اوجد في R مجموعة حل المعادلة
الآتية :

$$[1] x^2 = 4x$$

الحل

$$x^2 - 4x = 0$$

$$x(x - 4) = 0$$

$$x = 0 \text{ or } x = 4$$

$$\{0, 4\} = \text{م. ح.}$$

$$[2] 5x^2 + 15x = 0$$

الحل

$$5x(x + 3) = 0$$

$$5x = 0 \quad | \quad x + 3 = 0$$

$$\therefore x = 0 \quad | \quad x = -3$$

$$\{0, -3\} = \text{م. ح.}$$

[4] اذا كان $x = 2\sqrt{2}, y = 3\sqrt{3}$ اوجد
قيمة : $(y^3 - x^4)$

الحل

$$y^3 = (3\sqrt{3})^3 = 27 \times 3 = 81$$

$$x^4 = (2\sqrt{2})^4 = 16 \times 4 = 64$$

$$(x^3 - x^4) = 81 - 64 = 17$$

[14] اجب عما ياتي (التحليل باخراج ع. م. ا.)

[1] حل كثيرات الحدود الآتية باخراج

العامل المشترك الأكبر :

$$[1] 15x^3 + 5x^5$$

$$5x^3(3 + x^2)$$

$$[2] 8m^3 - 12m^2n + 20mn^2$$

$$4m(2m^2 - 3mn + 5n^2)$$

$$[3] x(x + 5) - 3(x + 5)$$

$$(x + 5)(x - 3)$$

$$[4] 9x^2 + 6xy$$

$$3x(3x + 2y)$$

$$[5] (x + 4)^2 + 3(x + 4)$$

$$(x + 4)(x + 4 + 3)$$

$$[3] 14^2 + 14 \times 4 - 14 \times 8 \text{ (b)}$$

$$14 (14 + 4 - 8)$$

$$14 \times 10 = 140$$

$$[4] 45 \times 55 + 45 \times 46 - 45 \text{ (c)}$$

$$45 (55 + 46 - 1)$$

$$45 \times 100 = 4500$$

$$[5] \text{ اذا كان } (2a + b) = 6, (3a + b) = 8$$

فاوجد القيمة العددية للمقدار :

$$3a(2a + b) + b(2a + b)$$

الحل

$$(2a + b)(3a + b)$$

$$8 \times 6 = 48$$

$$[17] \text{ اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات}$$

المعطاة :

$$[1] \text{ أي من الأعداد الآتية ليس عددا}$$

حقيقيا ؟

$$(أ) \frac{22}{7} \quad (ب) \sqrt{25}$$

$$(ج) \sqrt{-25} \quad (د) 25$$

$$[2] \text{ إذا كان } x + 1 < \sqrt{51} < x, x \in \mathbb{Z}$$

فإن قيمة $2x$ تساوى

$$(أ) 6 \quad (ب) 7$$

$$(ج) 8 \quad (د) 14$$

$$[3] 3x^2 + 18x = 0$$

الحل

$$3x(x + 6) = 0$$

$$3x = 0 \quad | \quad x = -6$$

$$\therefore x = 0$$

$$\text{م. ج. } \{0, -6\}$$

$$[4] 9y^2 - 18y = 0$$

الحل

$$9y(y - 2) = 0$$

$$9y = 0 \quad | \quad y - 2 = 0$$

$$y = 0 \quad | \quad y = 2$$

$$\text{م. ج. } \{0, 2\}$$

$$[16] \text{ باستخدام التحليل باخراج العامل}$$

المشترك الأكبر اوجد القيمة العددية

المقدار

$$[1] 6 \times \frac{5}{7} + 2 \times \frac{5}{7} - \frac{5}{7}$$

$$\frac{5}{7} (6 + 2 - 1)$$

$$\frac{5}{7} \times 7 = 5$$

$$[2] 25 \times 11 + 25 \times 18 - 25 \times 9$$

$$25 (11 + 18 - 9)$$

$$= 25 \times 20 = 500$$

18 ما مجموعة حل المعادلة :

$$x^2 + 1 = 0 \text{ في } R ?$$

(أ) $\{-1\}$ (ب) $\{1, -1\}$

(ج) $\{1\}$ (د) $\emptyset$

19 إذا كان x, y عددين صحيحين

متتاليين ، فما قيمة $y + x$ ؟



(أ) 11 (ب) 13

(ج) 15 (د) 17

20 إذا كان $a\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$ فان

قيمة a تساوي

(أ) 7 (ب) 6

(ج) 9 (د) 10

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{3\sqrt{3}}\right)^6 = \dots\dots\dots 21$$

(أ) $\sqrt{3}$ (ب) $\sqrt[3]{3}$

(ج) 3 (د) 9

22 الفترة التي عبر عن $[1, 4] \cup \{1\}$

هي

(أ) $[1, 4]$ (ب) $[1, 4[$

(ج) $]1, 4]$ (د) $]1, 4[$

13 ما تقدير العدد $\sqrt[3]{25}$ لأقرب عدد

صحيح؟

أ- 2 ب- 3

ج- 5 د- 12.5

14 أي من الأعداد التالية عدد غير نسبي

يقع بين 2 ، 3 ؟

أ- 2.5 ب- $\sqrt{10}$

(ج) $\sqrt{6.25}$ (د) $\sqrt[3]{9}$

15 إذا كان $1 < \sqrt{n} < 2$

فأي مما يلي قيمة محتملة للعدد n ؟

أ- 1 ب- 2

ج- 4 د- 8

16 طول ضلع مربع مساحته 6 سم² هو

عدد

أ- طبيعي ب- صحيح

(ج) نسبي (د) غير نسبي

17 ما طول ضلع المربع الذي مساحته

10 سم² ؟

(أ) 5 سم (ب) 5 - سم

(ج) $\sqrt{10}$ سم (د) $\sqrt{10}$ - سم

61] اي مما يلي يكافئ $\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}}$ ؟

ا- $2\sqrt{6}$ ب- $6\sqrt{2}$

ج- 6 د- $\sqrt{70}$

62] اذا كان $\sqrt{160} = x\sqrt{10}$ ، فما قيمة

x؟

ا- 8 ب- 6

ج- 4 د- 3

63] ما المعكوس الضربي للعدد $\sqrt{50}$ ؟

ا- $\frac{\sqrt{2}}{10}$ ب- $\frac{-\sqrt{2}}{10}$

ج- $-5\sqrt{2}$ د- $5\sqrt{2}$

64] $\sqrt[3]{\frac{2}{9}} = \dots\dots\dots$

ا- $\frac{\sqrt[3]{6}}{3}$ ب- $\sqrt[3]{\frac{1}{6}}$

ج- $\sqrt[3]{6}$ د- $\sqrt[3]{2}$

65] اذا كان $a\sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{10}$ ، فما

قيمة a ؟

ا- 30 ب- $\sqrt[3]{30}$

ج- 15 د- $\sqrt[3]{15}$

56] اذا كان $\sqrt[3]{5} + 3a = 4\sqrt[3]{5}$ فان :

.....

ا- $a = 1$ ب- $a = \sqrt{5}$

ج- $a = \sqrt[3]{5}$ د- $a = 5$

57] ما المعكوس الجمعي للعدد $\frac{7}{\sqrt{7}}$ في

ابسط صورة ؟

ا- $\frac{\sqrt{7}}{7}$ ب- 7

ج- $-\sqrt{7}$ د- -7

58] ما المعكوس الضربي للعدد $\sqrt{5}$ في

ابسط صورة ؟

ا- -5 ب- $-\frac{1}{5}$

ج- $\frac{5}{\sqrt{5}}$ د- $\frac{\sqrt{5}}{5}$

59] ما المعكوس الضربي للعدد $\sqrt{3} - 2$ ؟

ا- $2 - \sqrt{3}$ ب- $\sqrt{3} + 2$

ج- $-\sqrt{3} - 2$ د- $\sqrt{3} - 2$

60] اي مما يلي يكافئ $\sqrt[3]{5} \times \sqrt[3]{25}$ ؟

ا- $\sqrt[3]{30}$ ب- 5

ج- $5\sqrt[3]{5}$ د- 125

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (6)

اختبار شهر اكتوبر





المختصر في الرياضيات



تدريبات نهاية الشهر الأول

أولاً - اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(1) أي من الأعداد الآتية ليس عدداً حقيقياً ؟

- (أ) $\frac{22}{7}$ (ب) $\sqrt{25}$ (ج) $\sqrt{-25}$ (د) 25

(2) إذا كان $x \in \mathbb{Z}$ ، $x < \sqrt{5} < x + 1$ فإن قيمة $2x$ تساوي

- (أ) 6 (ب) 7 (ج) 8 (د) 14

(3) إذا كان $a\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$ فإن قيمة a تساوي

- (أ) 7 (ب) 6 (ج) 9 (د) 10

(4) $\left(\frac{\sqrt{3}}{3\sqrt{3}}\right)^6 = \dots\dots\dots$

- (أ) $\sqrt{3}$ (ب) $\sqrt[3]{3}$ (ج) 3 (د) 9

(5) الفترة التي تعبر عن $1, 4$ هي

- (أ) $[1, 4]$ (ب) $]1, 4[$ (ج) $]1, 4|$ (د) $[1, 4[$

(6) $6x^2 + 18xy = 6x$ (.....+)

- (أ) $x + y$ (ب) $3y - x$ (ج) $x + 3y$ (د) $20x^3y$

(7) $N \cap [1, 4]$

- (أ) $[1, 4]$ (ب) $\{1, 2, 3, 4\}$ (ج) $\{2, 3\}$ (د) $\{1\}$

(8) إذا كان $\frac{x}{y} = \frac{y}{x} = 1$ فإن قيمة $x^2 + y^2$ تساوي

- (أ) 7 (ب) 10 (ج) 10 (د) 14

(9) مجموعة حل المعادلة $x^2 + 25x = 0$ في R هي

- (أ) $\emptyset$ (ب) $\{25, 0\}$ (ج) $\{-25, 0\}$ (د) $\{0\}$

$x(x+25)=0$

$x=0$

$x=-25$

للتواصل



01023630376



01158104149

6

أستاذ/ جمال أبو زيد

إعداد



ثانيًا - اجب عن الأسئلة الآتية :

(1) أوجد في R مجموعة الحل للمعادلة: $x^3 + 1 = 730$

$$\Rightarrow x^3 = 730 - 1$$

$$x^3 = 729 \quad \text{الجزر التكعيبي}$$

$$x = \sqrt[3]{729}$$

$$x = 9$$

$$\text{م.ح في } R = \{9\}$$

(2) أوجد في أبسط صورة ناتج المقدار: $(\sqrt{3} - 1)^2 + (\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)$

$$= 3 - 2\sqrt{3} + 1 + 3 - \sqrt{3} + \sqrt{3} - 1$$

$$= (3 + 1 + 3 - 1) + (\sqrt{3} - 2\sqrt{3} - \sqrt{3})$$

$$= 6 + (-2\sqrt{3})$$

$$= 6 - 2\sqrt{3}$$



(3) اختصر لأبسط صورة، $2\sqrt{32} + \sqrt{18} + \sqrt{50}$


$$= 2\sqrt{16 \times 2} + \sqrt{9 \times 2} + \sqrt{25 \times 2}$$

$$= 2 \times 4\sqrt{2} + 3\sqrt{2} + 5\sqrt{2}$$

$$= 8\sqrt{2} + 3\sqrt{2} + 5\sqrt{2}$$

$$= 16\sqrt{2}$$

(4) مستعينا بخط الأعداد مثل الفترتين $X = [1, 3]$ ، $Y =]0, 2]$ ، ثم أوجد $X \cup Y$



$$X \cup Y =]0, 3]$$



5) في الشكل المقابل ، أوجد مساحة المثلث .

$$A = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} \times 2\sqrt{2}$$

$$= 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2}$$

$$= 8$$

6) إذا كان: $a = (\sqrt{7} - \sqrt{5})$ ، $b = \frac{2}{a}$ فأوجد في أبسط صورة:

$a - b$ (2)

ab (1)

$$a = (\sqrt{7} - \sqrt{5}) \quad , \quad b = \frac{2}{\sqrt{7} - \sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{7} + \sqrt{5}}{\sqrt{7} + \sqrt{5}}$$

$$\therefore b = \frac{2(\sqrt{7} + \sqrt{5})}{7 - 5} = \sqrt{7} + \sqrt{5}$$

$$\therefore ab = (\sqrt{7} - \sqrt{5})(\sqrt{7} + \sqrt{5})$$

$$ab = 7 - 5$$

$$ab = 2$$



$$\therefore a - b$$

$$= \cancel{\sqrt{7}} - \sqrt{5} - \cancel{\sqrt{7}} - \sqrt{5}$$

$$a - b = -2\sqrt{5}$$



(7) مستعينا بخط الأعداد مثل الفترتين $X = [3, 6]$ ، $Y =]1, 5]$ ثم أوجد $X \cap Y$



$$X \cap Y = [3, 5]$$

(8) أوجد قيمة x إذا كان $x\sqrt[3]{10} = \sqrt[3]{80} - \sqrt[3]{270}$

$$x\sqrt[3]{10} = \sqrt[3]{80} - \sqrt[3]{270}$$

$$x\sqrt[3]{10} = \sqrt[3]{8 \times 10} - \sqrt[3]{27 \times 10}$$

$$x\sqrt[3]{10} = 2\sqrt[3]{10} - 3\sqrt[3]{10}$$

$$x\sqrt[3]{10} = -\sqrt[3]{10} \quad \div \sqrt[3]{10}$$

$$x = -1$$



المختصر في الرياضيات




9) إذا كان $x = 2\sqrt{2}$, $y = 3\sqrt{3}$ أوجد قيمة $(y^3 - x^4)$

$$y^3 = 3\sqrt{3} \times 3\sqrt{3} \times 3\sqrt{3} = 27 \times 3 = 81$$

$$x^4 = 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = 16 \times 4 = 64$$

$$\therefore (y^3 - x^4) = 81 - 64 = 17$$



الاداءات والتقييمات

الرياضيات

10) أوجد قيمة كل ما يأتي بإخراج العامل المشترك الأكبر:

$$25 \times 11 + 25 \times 18 - 25 \times 9 \text{ (a)}$$

$$14^2 + 14 \times 4 - 14 \times 8 \text{ (b)}$$

$$= 14(14 + 4 - 8)$$

$$= 14 \times 10$$

$$= 140$$

⑥

$$= 25(11 + 18 - 9)$$

$$= 25 \times 20$$

$$= 500$$

⑤

للتواصل



01023630376



01158104149

11

إعداد / استاذ جمال أبوزيد



$$45 \times 55 + 45 \times 46 - 45 \text{ (c)}$$

(c)

$$= 45(55 + 46 - 1)$$

$$= 45 \times 100$$

$$= 4500$$

(11) إذا كان: $X =]-\infty, 10[$ فأوجد مكملته X'



$$X =]-\infty, 10[$$

$$X' = \mathbb{R} - X$$

$$=]-\infty, \infty[-]-\infty, 10[$$

$$= [10, \infty[$$



(12) أوجد في أبسط صورة : $\frac{\sqrt{98} + \sqrt{18}}{\sqrt{50}}$

$$= \frac{\sqrt{49 \times 2} + \sqrt{9 \times 2}}{\sqrt{25 \times 2}}$$

$$= \frac{7\sqrt{2} + 3\sqrt{2}}{5\sqrt{2}}$$

$$= \frac{10\cancel{\sqrt{2}}}{5\cancel{\sqrt{2}}}$$

$$= \frac{10}{5}$$

$$= 2$$



المختصر في الرياضيات



(13) إذا كانت: $x = \sqrt{5} + \sqrt{3}$ ، $y = \sqrt{5} - \sqrt{3}$ فأوجد في أبسط صورة كلاً مما يأتي:

$$x - y \quad (3) \quad xy \quad (2) \quad (x + y)^2 \quad (1)$$

$$x - y$$

$$= \sqrt{5} + \sqrt{3} - \sqrt{5} + \sqrt{3}$$

$$= 2\sqrt{3}$$

$$xy$$

$$= (\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3})$$

$$= 5 - 3$$

$$= 2$$

$$x + y =$$

$$= \sqrt{5} + \sqrt{3} + \sqrt{5} - \sqrt{3}$$

$$= 2\sqrt{5}$$

$$(x + y)^2 = (2\sqrt{5})^2$$

$$20 = 4 \times 5$$

(14) أيهما أكبر: طول ضلع مربع مساحة سطحه 25 سم² أم طول حرف مكعب حجمه 216 سم³.

حجم المكعب = V

$$V = s^3$$

$$216 = s^3$$

$$\sqrt[3]{216} = \sqrt[3]{s^3}$$

$$s = 6$$

ضلع المربع = A

$$A = s^2$$

$$25 = s^2$$

$$\sqrt{25} = \sqrt{s^2}$$

$$s = 5$$

ضلع المربع > حرف المكعب

للتواصل

01023630376

01158104149

14

أستاذ/ جمال أبوزيد

إعداد



(16) أوجد في أبسط صورة : $\frac{(\sqrt{3})^n \times (\sqrt{2})^{n+2}}{(\sqrt{6})^n}$

$$= \frac{(\sqrt{3})^n \times (\sqrt{2})^{n+2}}{(\sqrt{6})^n} = \frac{(\sqrt{3})^n \times (\sqrt{2})^{n+2}}{(\sqrt{3})^n \times (\sqrt{2})^n}$$

$$= (\sqrt{3})^{n-n} \times (\sqrt{2})^{n+2-n}$$

$$= (\sqrt{3})^0 \times (\sqrt{2})^2 = 1 \times 2 = 2$$

(17) إذا كانت : $x = \sqrt{2}$ ، $y = 2$ ، فأوجد في أبسط صورة : $x^{-10} y^{10}$

$$x^{-10} y^{10} = \frac{y^{10}}{x^{10}} = \frac{(2)^{10}}{(\sqrt{2})^{10}}$$

$$= \frac{2^{10}}{2^5} = 2^{10-5} = 2^5 = 32$$



(18) أوجد في R مجموعة حل المعادلة الآتية: $x^2 = 4x$

$$x^2 - 4x = 0$$

$$x(x - 4) = 0$$

$$x = 0 \quad \text{أو} \quad x - 4 = 0$$

$$x = 4$$

(19) عبر عن الموقف الآتي بمتباينة مناسبة ثم اكتبها على صورة فترة ومثلها على خط الأعداد:

يُشترط أن لا يقل عمرك عن 20 سنة ولا يزيد عن 40 سنة لتلتحق بوظيفة ما.

بفرض x بحرك =




متباينه $20 \leq x \leq 40$

فترة $[20, 40]$

دفعه الك بطال

2026 ع 2



أ. جمال أبو زيد





(20) أجعل المقام في العدد $\frac{4}{\sqrt{7} + \sqrt{3}}$ عدداً صحيحاً.

$$= \frac{4}{\sqrt{7} + \sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{7} - \sqrt{3}}{\sqrt{7} - \sqrt{3}}$$

$$= \frac{4(\sqrt{7} - \sqrt{3})}{7 - 3} = \frac{4(\sqrt{7} - \sqrt{3})}{4} = \sqrt{7} - \sqrt{3}$$

(21) إذا كانت $3^x = 5$ فأوجد القيمة العددية لكل من :

(3) $3^{x+2} + 3^{x+3}$

(2) 3^{x-1}

(1) 3^{x+1}

$$3^{x+2} + 3^{x+3}$$

$$= 3^x \times 3^2 + 3^x \times 3^3$$

$$= 3^x (3^2 + 3^3)$$

$$= 5(9 + 27)$$

$$= 5 \times 36 = 180$$

$$3^{x-1} = \frac{3^x}{3^1}$$

$$3^{x-1} = \frac{5}{3}$$

$$3^{x+1} = 3^x \times 3^1$$

$$= 5 \times 3$$

$$3^{x+1} = 15$$



السؤال الأول

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :-

- ① العدد الغير نسبي في الاعداد الآتية هو
 ① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt[3]{125}$ ③ $-\sqrt{36}$ ④ $0, \bar{3}$
- ② $\mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}' = \dots\dots\dots$
 ① $\emptyset$ ② $\mathbb{Q}$ ③ $\mathbb{R}$ ④ $\mathbb{Q}'$
- ③ المعكوس الضربي للعدد $\sqrt{3}-2$ هو
 ① $2-\sqrt{3}$ ② $-\sqrt{3}-2$ ③ $\sqrt{3}+2$ ④ $\sqrt{3}-2$

السؤال الثاني

أكمل الجمل الآتية بالإجابة الصحيحة :-

- ① $\{3\} \cup]3, 6[= \dots\dots\dots$
- ② $x(a+b) + y(a+b) = \dots\dots\dots$
- ③ إذا كان : $(\sqrt{5})^x \times \sqrt{5} = 1$ فإن : قيمة $X = \dots\dots\dots$

السؤال الثالث

اجب عما يأتي مع كتابة خطوات الحل :-

- ① أوجد في $\mathbb{R}$ مجموعة حل المعادلة : $2(x^3+1)=18$
الحل
- ② اختصر لأبسط صورة : $\sqrt{98} - \sqrt{128} - \sqrt{18} + 4\sqrt{2}$
الحل
- ③ إذا كانت : $X =]-\infty, 5]$ ، $Y = [-3, \infty[$ فأوجد مستعيناً بخط الأعداد كل من :
 A $X \cup Y$ B $X \cap Y$ C $Y - X$
الحل

كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين مثلا ازاي نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9

